



RD CONGO

**EPIDEMIE D'EBOLA : POINT DE SITUATION ET
ETAT DES RISQUES 22.05.2026**

... - ... - ...


Point sanitaire au 22 mai 2026

Contexte | Le **5 mai**, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a reçu une alerte sur le développement d'une épidémie de haute mortalité localisée dans la **province d'Ituri, en République Démocratique du Congo (RDC)**. Le **15 mai**, des analyses effectuées en laboratoire ont permis d'identifier formellement le **virus Bundibugyo, une souche d'Ebola** particulièrement mortelle (taux de létalité entre 30% et 50%), et pour laquelle il n'existe **pas de vaccin ou de traitement connu**. Le **16 mai**, l'OMS a qualifié l'épidémie « **d'urgence de santé publique de portée internationale** » en **RDC et en Ouganda**.

Dynamique épidémique et zones impactées | Au **22 mai**, l'OMS rapporte plus de **750 cas suspectés, 82 cas confirmés et 177 décès**. Le foyer principal est localisé dans la **province d'Ituri**, notamment dans les territoires de **Djugu et Irumu**, et autour de la ville de **Bunia**, mais s'est propagé ces derniers jours/heures au **Nord-Kivu**, avec des cas rapportés à **Katwa, Butembo et Goma** et au **Sud-Kivu**, avec 2 cas confirmés à **Kabare**. Le risque a été réévalué au niveau maximal (« très élevé ») par l'OMS. **Aucun cas** n'a été rapporté dans la capitale **Kinshasa, ni au Burundi, Rwanda et au Soudan du Sud**. En **Ouganda**, **2 cas** ont été confirmés à **Kampala**, dont l'un mortel, avec une situation jugée « stable ».

Le virus Ebola | Cette **fièvre hémorragique** se transmet par **contact direct avec les fluides corporels**. Après une incubation variant de **2 à 21 jours**, la maladie se manifeste d'abord par des symptômes évoquant ceux d'une grippe (fièvre, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires), puis d'éventuels troubles digestifs (vomissements, diarrhées, douleurs abdominales...) suivis par de potentiels saignements et/ou d'atteintes d'organes.

Epidémie d'Ebola en RD Congo, à date du 22 mai 2026



- 🎯 Villes principales affectées
- 🟪 Provinces de RDC affectées
- 🟥 Territoires à propagation intensive (Djugu et Irumu)
- 🟡 Districts d'Ouganda classés "à haut risque"

Mesures et impacts sur les déplacements

RDC et pays voisins

RD Congo

- Consignes générales de précaution et d'isolation
- Etablissements publics majoritairement ouverts
- **Contrôles de température** réalisés à **l'aéroport de Bunia**

Ouganda

- **Fermeture de la frontière avec la RDC aux passagers et suspension pour 4 semaines de l'ensemble des transports publics** (vols, ferries, bus transfrontaliers, à l'exception du fret)
- **Districts de Wakiso, Kampala** et les zones de la frontière placés sous surveillance sanitaire par les autorités ougandaises.
- **Contrôle renforcé à l'aéroport d'Entebbe**

Burundi

- Déclaration d'un « **état d'alerte maximale** »
- **Renforcement des contrôles aux points d'entrée** du pays et installation de structures temporaires de dépistage

Rwanda

- **Fermeture jusqu'à nouvel ordre du poste-frontière de Goma-Gisenyi** avec la RDC

Soudan du Sud

- **Mesures de surveillance à Djouba, Yambio et sur certains postes-frontières** (Nimule)

Voyageurs internationaux

Etats-Unis

- **Transit et dépistage obligatoire à l'aéroport de Washington-Dulles (IAD)** pour tout ressortissant américain ou résident permanent ayant séjourné en **RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud** dans les 21 jours précédant son arrivée aux États-Unis

Bahreïn

- **Suspension pour 1 mois de l'entrée** des visiteurs non bahreïnais en provenance de **RDC, du Soudan du Sud et d'Ouganda**.

Jordanie

- **Interdiction temporaire de l'entrée des voyageurs non jordaniens en provenance de RDC et d'Ouganda** ; les ressortissants jordaniens revenant de ces pays devront observer une quarantaine de 21 jours.

Risques et recommandations

Risques à court-terme

- Risque épidémique considéré comme **très élevé au niveau national, élevé au niveau régional et faible au niveau mondial selon l’OMS**, avec une épidémie qui pourrait durer plus de 2 mois.
- **Risque de propagation régional** alimenté par la situation sécuritaire et humanitaire dégradée dans l’Est de la RDC, le manque d’équipement, les flux transfrontaliers et une réponse internationale moins coordonnée que lors des précédentes flambées du virus (en raison notamment du retrait américain de l’OMS et de la réduction des moyens de l’USAID).
- **Elargissement des mesures de contrôle sanitaire/restrictions de voyages ou rassemblements possibles** au cours des prochains jours par plusieurs pays en fonction de l’évolution de la situation.

Recommandations

- **Eviter temporairement les déplacements non impératifs dans les zones les plus affectées (RDC) et les rassemblements**
- **Se tenir régulièrement informé** de l’évolution de la situation sanitaire en consultant les comptes Twitter des ministères locaux de la Santé, les sites des services diplomatiques et de l’OMS
- **Respecter strictement les règles d’hygiène** (se laver les mains régulièrement au savon ou gel hydro-alcoolique)
- **Ne pas consommer ni manipuler de viande de brousse**
- **Eviter les contacts directs** avec les secrétions des personnes potentiellement malades, présentant des symptômes évocateurs et tout contact avec les animaux sauvages potentiellement infectés
- **Consulter rapidement en cas d’apparition de symptômes alertants** (fièvre, troubles gastro-intestinaux, céphalées, courbatures), jusqu’à 21 jours après le retour d’une zone exposée/d’un territoire impacté.